



Serviço de Cirurgia de Joelho

Márcio A. C. Pedro

Protocolo de Osteotomia de Fêmur Distal

- 1- Todos pacientes com avaliação pré-anestésica.
- 2- Avaliação dos pacientes no ambulatório 1 semana antes da data da cirurgia.
- 3- Todos com radiografia panorâmica ortostática com os eixos e ângulos medidos + radiografia de perfil.
- 4- Checar material a ser usado e providenciar a reserva do intensificador de imagem.
- 5- Antibióticoterapia profilática com Cefazolina 1G EV na indução anestésica e de 8/8 horas por 48 horas.
- 6- Transamim (ou similar) 4 ampolas EV na indução anestésica e 4 ampolas EV após 4 horas.
- 7- Tricotomia no centro cirúrgico.
- 8- Artroscopia prévia no mesmo ato cirúrgico.
- 9- Enxerto de íliaco em todos casos - preparar área doadora.
- 10- Realizar infiltração de naropin na área doadora.
- 11- Fechamento das incisões por planos.
- 12- Curativo compressivo.
- 13- Alta no dia seguinte com protocolo da fisioterapia.
- 14- Uso de par de muletas por 8 semanas com toque de solo.
- 15- Retorno em 1 semana para o primeiro curativo.
- 16- Retorno com 2 semanas para retirar pontos.
- 17- Retorno com 4 e 8 semanas com novos RX.
- 18- Retorno com 12 semanas, 6 meses e anual.

*** Intercorrências ou fatos que saiam do protocolo devem ser comunicados imediatamente ao R4 ***